

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกักที่สำคัญคือ โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีความเสี่ยงดังนี้

- ถูกกัด โอกาสจะเป็นโรคเฉลี่ยประมาณ 35 % ขึ้นอยู่กับบริเวณที่กัด
- ถูกกัดที่ขาโอกาสเป็นโรค 21 %
- ถูกกัดที่หน้าโอกาสเป็นโรค 88 %
- ถ้าแผลฉีกหรือเป็นรอยถลอก จะเป็นโรคน้อยกว่าแผลลึก ๆ หลาย ๆ แผล
- เชื้อติดต่อสู่คนทางน้ำลาย
- ระยะที่แสดงออกอาจตั้งแต่ 4 วัน ถึง 4 ปี

อาการของสุนัขที่เป็นพิษสุนัขบ้า

แบ่งเป็น 3 ระยะ

1. ระยะอาการนำ จะซึมลง กินข้าวและน้ำน้อยลง ระยะนี้กินเวลา 2 – 3 วัน ก่อนเข้าระยะที่สอง
2. ระยะตื่นเต้น เป็นอาการทางระบบประสาท สุนัขกระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกอย่างที่ขวางหน้า ตัวแข็ง น้ำลายไหล ลิ้นห้อย ต่อมามีกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทรงตัวไม่ได้ สัมแล้วลุกไม่ขึ้น ระยะนี้พบได้ 1-7 วัน ก่อนเข้าระยะสุดท้าย
3. ระยะอัมพาต จะเกิดอัมพาตทั่วตัวถ้ามีอาการอัมพาตสุนัขจะตายใน 24 ชั่วโมง ระยะเวลารวมทั้งเริ่มมีอาการจนถึงตายไม่เกิน 10 วัน ส่วนใหญ่จะตายใน 4-6 วัน

อาการของพิษสุนัขบ้าในคน

แบ่งเป็น 3 ระยะ

1. ระยะอาการนำ จะเริ่มมีไข้อ่อนเพลีย คล้ายเป็นไข้หวัด อาจมีปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อาการที่แปลกไป คือ อารมณ์เปลี่ยนแปลง กังวล กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ และในคนไทย พบว่ามีอาการคันรอบ ๆ บริเวณที่ถูกกัด หรือคันแขนขาข้างที่ถูกกัด หรือคันแขนขาที่ถูกกัด อาจมีอาการชา เจ็บเสียวรอบ ๆ บริเวณที่ถูกกัด
2. ระยะอาการทางระบบประสาท แบ่งย่อยเป็น
 - 2.1 อาการกลัวน้ำ จะมีอาการตึงแน่นในลำคอ กลืนอาหารแข็งได้แต่กลืนอาหารเหลวลำบาก เวลากินน้ำจะสำลัก และเจ็บปวดเนื่องจากกล้ามเนื้อในลำคอกระตุกเกร็ง ร้อยโหยหวนคล้ายหมาเห่าหอน เพราะ

กล้ามเนื้อควบคุมสายเสียงเป็น

อัมพาต

2.2 อาการกลืนลำบาก ผู้ป่วยจะสะอึก
ผวา เมื่อถูกลมพัด

2.3 อาการประสาทไว ผู้ป่วยจะ
กลัวสะดุ้งเกร็งต่อสัมผัสต่าง ๆ
ไม่ชอบแสงสว่าง

2.4 อาการคลุ้มคลั่งประสาท
หลอน ผู้ป่วยอาจอาละวาด คุ
ร่ายน่ากลัว

2.5 อาการอื่น ๆ เช่น อัมพาต

3. ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยไม่รู้สึกรู้ตัว เข้า
สู่ระยะ โคม่า

การปฐมพยาบาล

1. รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลาย ๆ ครั้ง
พยายามล้างให้เข้าถึงรอบแผล ถ้าไม่มี
สบู่ใช้ผงซักฟอกแทนก็ได้
2. ถ้าแผลฉกรรจ์ มีเลือดออก ควรปล่อย
ให้เลือดออกก่อนระยะหนึ่ง เพื่อล้าง
น้ำลายซึ่งอาจมีเชื้อไวรัสออก
3. ถ้าสามารถเฝ้าดูอาการสัตว์ (กรณีที่มี
เจ้าของ) ควรกักขังและเฝ้าดูอาการอย่าง
น้อย 10 วัน
4. กรณีที่สัตว์ตาย ควรนำส่งเพื่อตรวจหา
เชื้อด้วย
5. ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีน
ป้องกันบาดทะยักทันที ไม่จำเป็นต้องรอ
ให้สัตว์มีอาการก่อน

โรคพิษสุนัขบ้า



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
ตำบลบางเตย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 24000

โทรศัพท์ 0-3856-5000

โทรสาร 0-3856-5200

โรคพิษสุนัขบ้า

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม